

**Выписка из амбулаторной карты
Голдышева Матвей Константиновича 19.12.2016г.р.**

Находится на «Д» наблюдении у врача психиатра с диагнозом:

F83, Смешанное специфическое расстройство психологического развития. Общее недоразвитие речи II уровня с нарушением кооммуникативных функций речи. Аутистический синдром.

Анамнез жизни: Родился от 4 беременности путём ЭКО, один из двойни. Беременность протекала на фоне хронического пиелонефрита, токсикоза, угрозы прерывания, ХФПН, Lues в анамнезе (2016г). Роды 1, срочные, в срок 38 недель, путём Кесарева сечения. При рождении вес 2880г, по Апгар 7-8б. Выписан домой на 8 сутки с диагнозом: ППЦНС, желтуха. Голову держит с 2 месяцев, сидит с 6 месяцев, ходит с года. Первые слова к 2 годам. Фразовая речь после 3 лет в виде эхололий. Навыки опрятности развивались с задержкой. Детский сад с 2 лет 8 месяцев. Адаптировался тяжело, к детям интерес не проявлял. С 5 лет посещал группу для детей с ЗПР. В 2024г окончил ДОУ. ЧМТ, туберкулёз, операций не было. Аллергологический анамнез не отягощен.

Семейный анамнез не отягощен

Анамнез заболевания: С рождения наблюдается у невролога. Получал лечение курсами ноотропов, массажа. В январе 2019г принимал Церебрализин 1,5 в/м №10, Цераксон по 1,5мл 2 раза в день 1 месяц. В декабре 2019г — Гопентеова кислота 0.25 по 1 та 2 раза в день 2 месяца К психиатру впервые обратился в январе 2020г с жалобами на: отставание в нервно психическом развитии от сверстников, малый словарный запас, отсутствие фразы, общается жестами, криком, не играет с детьми, не участвует в занятиях, кусается, может раздеться в детском саду догола. Были назначены: р-р Кортексин 10мг. в/м №10 (на 1 мл. 0,5 % раствора новокаина, с пробой), затем р-р. Семакс 0,1% в нос 2 кап 1 раз утром 10 дней кап.- 10 дней перерыв, таких курса, таб. Фенилмасляная кислота 0,25 по ½ таб 2 раза в день 1,5 мес. С января 2021г принимал мемантин по 5мг 2 раза в день 3 месяца. В марте 2021г назначен Алимемазин 0.005 по ¼ таб 2 раза в месяц. С 10.09.2021г по 30.09.2021г находился на лечении в АКПДД. После выписки принимал сир Энцефабол 80,5мг/5мл по 5мл 2 раза в день 3 месяца, таб Мексидол 0.125 по ¼ таб 3 раза в день 3 месяца, таб Тиоридазин 0.01 по ½ таб 3 раза в день 6 месяцев. В феврале 2022г принимал Семакс 0.1% по 1 капле в каждый носовой ход 2 раза в день 10 дней. 10 дней перерыв, таких 3 курса, Когитум 5мл 2 раза в день 10 дней. 10 дней перерыв, таких 3 курса С 2022г регулярно проходит курсы микротоковой рефлексотерапии №15: в январе 2022г, в марте 2022г, в ноябре 2022г, в апреле 2023г, в октябре 2023г, в апреле 2024г. Нейролептики не принимал с 2022. С весны 2024г. принимает Неулептил по 1 капле утром.

С 5 лет посещал в детском саду группу для детей с ЗПР по рекомендации ПМПК. В мае 2024г выпустился из ДОУ. В феврале 2024 был представлен на МПК для определения программы обучения в школе, рекомендована программа 8,2. С 1 сентября посещает школу, коррекционный класс для детей с ЗПР. В классе неусидчив.

11.07.2024г на МСЭ признан инвалидом по категории ребёнок-инвалид. 13.09.2024г установлено динамическое наблюдение.

Жалобы: на отставание в психоречевом развитии, замкнутость, малообщительность, стереотипные действия.

Психический статус.

Контакту малодоступен, на имя не отзывается, просьбы не выполняет, обращенную речь игнорирует. Играть самостоятельно, стал игрушки использовать по назначению, но может разбрасывать. На месте удерживается в течение непродолжительного времени, поведение

полевое. Животных не показывает, не озвучивает. Д. Сегена, пирамидка- не выполняет. Выполняет задания очень избирательно, выражены реакции активного протеста и проявления псевдоглухоты. Счет сформирован, соотносит число и количество предметов. Спонтанно начинает читать вслух принесенную с собой книгу, составляет список рассказов в ней, самостоятельно записывает названия. Речь с эхоладиями, звукопроизношение нарушено. Запас знаний не соответствует возрасту. Навыки опрятности и самообслуживания сформированы. Легко раздражается, кричит, плачет. Ребенок дурашлив, негативистичен, гримасничает, совершает стереотипные движения руками. Страхи громких звуков — закрывает уши руками. Продуктивной симптоматики не выявлено. Критики нет.

Рекомендации:

1. "Д" наблюдение психиатра.
2. Медикаментозное лечение: Курсы ноотропов 2 раза в год. Нейролептическая терапия — по показаниям.
3. Стационарное лечение по показаниям
4. Занятия с психологом, логопедом
5. Обучение по программе определенной на ПМПК
6. ОАК, БАК, ЭЭГ, ЭКГ 1 раза в год.

13.09.2024г



врача-психиатра

Горбунов А.В.

«МИР В НАШИХ РУКАХ»